



PIANO STRATEGICO
DELLA **PAC**
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



Cofinanziato
dall'Unione Europea



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027—Intervento SRH06—“servizi di back office per l'AKIS”

GENOVA – bollettino n.19 del 17/09/2026

Bollettino Olivo

Centro di Agrometeorologia
Applicata Regionale (CAAR)

SITUAZIONE ATTUALE

La fase fenologica prevalente continua a essere quella di inizio maturazione (BBCH 80), in cui epidermide e polpa delle drupe assumono una colorazione tendente al giallastro, e **soltanto in alcuni oliveti**, in ritardo rispetto alle annate precedenti e limitatamente alle aree litoranee, è **possibile osservare le prime olive che iniziano a invaiare**.

Attenzione a non confondere la colorazione tipica della varietà con la **falsa invaiatura**, propria di olive con stato fitosanitario compromesso.

Incidenze significative di olive in tali condizioni risultano tuttavia per lo più correlate a situazioni anomale, quali oliveti irrigati, scarsa carica produttiva o prevalenza di varietà più soggette agli attacchi della mosca.



>> Permane lo **STATO di GRAVE PERICOLOSITÀ INCENDI BOSCHIVI** su tutto il territorio della Regione Liguria che prevede il divieto di abbruciamento di residui agricoli e forestali. Ulteriori dettagli al link [protezione civile - dichiarazioni di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Regione Liguria](#)

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756

e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it



www.facebook.com/agriligurianet



Telegram: CAARserviziBot



Autorità di Gestione CSR Liguria



PIANO STRATEGICO
DELLA **PAC**
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



Cofinanziato
dall'Unione Europea



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA


Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027—Intervento SRH06—“servizi di back office per l'AKIS”

GENOVA – bollettino n.19 del 17/09/2026




ANDAMENTO METEO

Andamento temperature massime nelle stazioni meteo più calde delle diverse fasce



Le temperature massime hanno registrato un rialzo rispetto alla scorsa settimana, salvo diminuire nuovamente nella giornata di ieri. I valori massimi non sono oramai più tali da determinare mortalità delle forme larvali di mosca olearia.

Cumulato degli ultimi 7 giorni nelle stazioni delle diverse fasce con precipitazioni più elevate



Le precipitazioni degli ultimi 7 giorni (che non tengono conto di quelle odierne) sono caratterizzate da cumulati molto rilevanti in alcune stazioni. I grafici riportati a fianco evidenziano l'andamento settimanale delle temperature massime e dei cumulati di pioggia relativi alle stazioni meteo che hanno registrato i valori più elevati nelle diverse fasce provinciali.

Previsioni meteo disponibili al link: <https://tinyurl.com/previsioniARPAL>

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756

e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it



www.facebook.com/agriligurianet



Telegram: CAARserviziBot



Autorità di Gestione CSR Liguria



PIANO STRATEGICO
DELLA **PAC**
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



Cofinanziato
dall'Unione Europea



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027—Intervento SRH06—“servizi di back office per l'AKIS”

GENOVA – bollettino n.19 del 17/09/2026



ANDAMENTO DEL CONTENUTO IN OLIO


Comune oliveto	Varietà	Quota	Sostanza grassa su fresco %	Sostanza grassa su secco %	Resa al frantoio prevista %
Chiavari	Lavagnina	150	18.21	36.01	12.0
Cogorno	Lavagnina	140	17.77	38.69	11.7
Genova	Miste	90	17.08	33.2	11.3
Genova	Pignola	115	14.15	31.76	9.3
Lavagna	Taggiasca	20	17.96	39.53	11.9
Lavagna	Lavagnina	70	19.08	37.8	12.6
Lavagna	Lavagnina	70	16.28	33.52	10.7
Lavagna	Lavagnina	120	18.83	38.76	12.4
Levi	Lavagnina	160	16.11	33.24	10.6
Santa Margherita	Lavagnina/Pignola	115	18.11	36.4	12.0
Sestri Levante	Lavagnina	120	18.86	38.57	12.4
Sestri Levante	Lavagnina	60	16.58	32.61	10.9
MEDIA			17.42	35.84	11.50

Dati del 15/09/2026. I dati relativi all'intero territorio regionale sono disponibili al link: <https://tinyurl.com/inolizione2026>

Questa settimana presso il **Laboratorio regionale di Sarzana** sono state eseguite le **prime determinazioni del contenuto in olio** allo scopo di fornire indicazioni sullo stato di maturazione delle olive, utili per pianificare le raccolte. **Il contenuto medio in olio espresso sul peso fresco è risultato essere circa 17,42% (min 14,1% max 19,1% e possibili rese al frantoio comprese tra 9,3% e 12,6%).** I valori su fresco sono risultati mediamente superiori a quelli del 2025 e la differenza ha raggiunto quasi 4 punti percentuali.

Il contenuto medio in olio espresso sul peso secco, (valore non influenzato dall'idratazione delle olive e utile per valutare il progresso del processo di inolizione) è risultato essere 35,8%. Tale valore è risultato superiore a quello del 2025 di quasi 6 punti percentuali. Significativo anche il confronto con i dati disponibili per la varietà liguri, rispetto ai quali l'accumulo di olio risulta in largo anticipo.

ANDAMENTO % OLIO



E' opportuno ricordare che la maturazione delle olive e l'accumulo in olio dipendono da molti fattori (es. idratazione delle olive, varietà, microclima, tecnica di coltivazione, carica produttiva) per cui la variabilità tra un oliveto e l'altro può essere molto elevata, e che **la resa non è un parametro di qualità dell'olio.**

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR

Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756

e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriliguri.net - sia.regione.liguria.it



www.facebook.com/agriliguri.net



Telegram: CAARserviziBot



Autorità di Gestione CSR Liguria



GENOVA – bollettino n.19 del 17/09/2026



SITUAZIONE MOSCA

Le condizioni sono state favorevoli all'attività della mosca che ha ripreso la sua attività di ovideposizione.

In diversi areali provinciali sono state rilevate **infestazioni attive pari o superiori alla soglia di intervento** e costituite in prevalenza da larve di prima età e uova. Nelle aree evidenziate in rosso in tabella è possibile **pianificare la raccolta delle olive non appena i frantoi inizieranno le attività di molitura** (indicativamente entro la prima decade di ottobre), senza rischiare di compromettere la qualità dell'olio. In alternativa alla raccolta anticipata è possibile effettuare **tempestivamente un trattamento con prodotti ad azione larvicida** e attendere almeno il relativo intervallo di sicurezza.

La presenza di infestazioni dannose risulta invece generalmente contenuta, salvo particolari situazioni, quali ad esempio oliveti irrigati, con scarsa carica produttiva o con prevalenza di varietà più suscettibili agli attacchi della mosca olearia, nei quali le infestazioni estive potrebbero essere risultate più rilevanti.

LOTTA GUIDATA MOSCA OLEARIA - Andamento su SCALA PROVINCIALE				
ZONE		0 - 100 m Inf. Attiva (%)	100 - 200 m Inf. Attiva (%)	200 - 350 m Inf. Attiva (%)
 FASCIA 1 COSTA	LEVAN- TE	10% TRATTARE o PREVEDERE RACCOLTA ANTICIPATA	7% TRATTARE o PREVEDERE RACCOLTA ANTICIPATA	NON TRATTARE 3%
	PONEN- TE	TRATTATO 03/09	TRATTATO 10/09	
 FASCIA 2 PRIMO ENTROTERRA	LEVAN- TE	TRATTATO 03/09	TRATTATO 03/09	TRATTATO 03/09
	PONEN- TE	10% TRATTARE o PREVEDERE RACCOLTA ANTICIPATA	TRATTATO 03/09	TRATTATO 03/09
 FASCIA 3 ENTROTERRA	UNICA	7% TRATTARE o PREVEDERE RACCOLTA ANTICIPATA		NON TRATTARE 3%

Dati rilevati in collaborazione con APOL S.C.A.R.L., Cooperativa Olivicoltori Sestresi e Cooperativa Agricola Lavagnina

Le corrette modalità di lettura dei dati e dell'utilizzo dei modelli sono state descritte nel comunicato n.7 disponibile al seguente link: <https://sia.regione.liguria.it/index.php/ultimi-bollettini/>





GENOVA – bollettino n.19 del 17/09/2026



Centro di Agrometeorologia
Applicata Regionale (CAAR)

DIFESA DALLA MOSCA OLEARIA

PRODUZIONE INTEGRATA

Prodotti ad azione larvicida

È possibile utilizzare **flupyradifurone** (Sivanto Prime, max 1 intervento/anno indipendentemente dall'avversità, intervallo di sicurezza 14 giorni) oppure **acetamiprid** (per olive da olio: Kestrel i.s. 7 giorni o Epik SL i.s. 21 giorni; max 2 interventi/anno indipendentemente dall'avversità; per olive da mensa: Kestrel o Epik SL i.s. 28 giorni; max 1 intervento/anno indipendentemente dall'avversità).

Per avere meno vincoli in fase di raccolta, si consiglia di prevedere l'impiego dei prodotti con intervallo di sicurezza più breve negli ultimi interventi, in relazione anche a possibili difficoltà organizzative dovute ad esempio a condizioni meteo avverse.

Relativamente all'impiego di tali prodotti, si ricorda che:

- * devono essere **impiegati sulle forme larvali giovani** e quindi tempestivamente non appena rilevato **l'avvio delle infestazioni**
- * è necessario **acidificare la soluzione** (pH 5,5)
- * si consiglia di impiegare la dose massima consentita da etichetta.
- * la miscela con concimi fogliari o biostimolanti favorisce l'assorbimento del prodotto e ne migliora l'efficacia.

Esche proteiche

È ammesso l'impiego di **ciantraniliprole** (Exirel Bait) e **spinosad** (Spintorfly, impiegabile anche in BIO).

È possibile impiegarle secondo i limiti e le indicazioni riportate in etichetta, ma si ricorda che **in caso di elevata pressione della mosca il contenimento delle infestazioni potrebbe essere limitato** e risulta pertanto necessario verificare l'andamento delle infestazioni e integrare eventualmente la difesa con l'impiego di prodotti ad azione larvicida o prevedere il ricorso alla raccolta anticipata delle olive.

Maggiori informazioni sulla difesa nelle schede tecniche dedicata <https://bit.ly/RLmoscaolivo>





PIANO STRATEGICO
DELLA **PAC**
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



Cofinanziato
dall'Unione Europea



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027—Intervento SRH06—“servizi di back office per l'AKIS”

GENOVA – bollettino n.19 del 17/09/2026



DIFESA DALLA MOSCA OLEARIA

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Raccolta anticipata delle olive

Si ricorda che le tecniche di difesa disponibili in agricoltura BIO hanno una efficacia limitata in caso di elevata pressione della mosca olearia.

Si consiglia di prevedere la raccolta all'apertura dei frantoi, al fine di salvaguardare lo stato fitosanitario delle olive e la qualità dell'olio prodotto.

Azadiractina A (Oikos)

Ribadendo che è preferibile ricorrere alla raccolta anticipata, è tuttavia possibile impiegare in questa fase, anche al fine di posticipare la raccolta delle olive e attendere progressi nell'accumulo di olio.

Il primo intervento deve essere **eseguito tempestivamente, acidificando la soluzione e ripetendolo a distanza di circa 7-10 giorni dal precedente trattamento fino a un massimo di 3 volte.**

Al termine degli interventi prevedere la raccolta delle olive entro una settimana dal termine dell'intervallo di sicurezza (3 giorni).

Maggiori informazioni sulla difesa dalla mosca in BIO <https://bit.ly/RLolivobio>

